

## Informator dla rodziców - Powszechny program szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) - szczepienia w szkołach



### Szczepienia

**Jak wygląda szczepienie dzieci i młodzieży w szkole Dzieci w wieku po ukończeniu 9 r.ż. do ukończenia 14 r.ż. otrzymują podczas szczepienia szczepionkę Gardasil9 lub Cervarix. Ich szczepienie składa się z 2 dawek szczepionki - dwóch podawanych w odstępie 6-12 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki. Dzieci nie dostają kolejnej dawki przypominającej. Na szczepienie nie jest wystawiane skierowanie.**

Realizacja szczepienia w szkole nie wymaga wcześniejszego kontaktu z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wystarczy złożyć podpisany formularz deklaracji i zgody na szczepienie do dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie. Po szczepieniu w aplikacji mojeIKP lub IKP będzie dostępne poświadczenie o wykonanym szczepieniu dostępne w „Moje konto” po przełączeniu się na konto dziecka. W dniu szczepienia będzie potrzebny dokument tożsamości dziecka ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna.

**Szczepienie nie wymaga specjalnych przygotowań, ale jest kilka rzeczy, o które warto zadbać przed szczepieniem:**

1. postaraj się, aby Twoje dziecko się wyspało,
2. zachęć dziecko do aktywności fizycznej (podobnie jak sen to dobrze wpływa na odporność),
3. dopilnuj, aby dziecko nie było na czczo i zjadło pełnowartościowy posiłek,
4. nie odstawiaj samodzielnie przed szczepieniem leków, które regularnie przyjmuje Twoje dziecko - skonsultuj to z lekarzem,
5. szczepionka to zastrzyk w ramię, więc jeśli Twoje dziecko boi się zastrzyków, omów z nim tę sytuację.

W przypadku dzieci mających choroby związane z zaburzeniami odporności lub które podczas leczenia lub po szczepieniu wymagały pogłębionej diagnostyki lekarskiej rekomendujemy wykonanie szczepienia w POZ, pod którego aktualnie opieką jest dziecko. Każdy POZ ma względem zapisanych pacjentów obowiązek przeprowadzić szczepienie w ramach programu. Zawsze u osoby niepełnoletniej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Osoby przeprowadzające kwalifikację i osoby szczepiące zostały odpowiednio przeszkolone. Zgłoś to i omów z personelem szczepiącym, jeżeli twoje dziecko miało ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu, lub zemblało po zastrzyku.

### **Co warto wiedzieć o szczepieniu:**

Szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny. Dziecko nie zostanie zaszczepione, jeśli ma ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia. Po podaniu szczepionki dziecko zostanie pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

### **Szczepionka:**

Ma postać zawiesiny do wstrzykiwań w gotowych do użycia ampułko-strzykawkach o pojemności 0,5 ml (ulotka dla pacjenta).

Nie obawiaj się niepożądanych odczynów poszczepiennych u Twojego dziecka. Występują one rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg. Objawy takie jak zaczerwienienie w miejscu wkłucia lub niewielka gorączka zazwyczaj ustępują w ciągu 1-3 dni. Możesz podać dziecku paracetamol, jeśli się nieco gorzej poczuje, ale pamiętaj, by nie przekraczać dozwolonej dawki dziennej tego leku. W przypadku większego dyskomfortu lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, skontaktuj się z lekarzem.

Sławomir Kudliński